


Checklist – Alta pós operatório

Esta lista não pretende ser abrangente. Inserções e modificações são incentivadas para ela se adequar a prática local.

Cuidados primeiros dias pós-operatório	Cuidados primeiras semanas pós-oper	Cuidados após os 7 dias pós oper.
<p><i>Opiniões da Equipe Cirúrgica/ Pós operatório:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• O paciente encontra-se acordado e respira sem ajuda?• Os pais foram orientados em como alimentar seu filho (usando mamadeira, colheres ou peito?)• O paciente já foi alimentado pelos seus pais após a cirurgia, na presença de uma enfermeira?• Mostrar para os pais como limpar a pele ferida com água e um cotonete de algodão(não para incisões e feridas intra-oral)• Verificar e garantir que suprimentos adequados estarão disponíveis no momento da alta.  <p>SmileTrain Changing The World One Smile At A Time.</p>	<p><i>Revisão do cirurgião, enfermeira ou Assistente Social com os pais / tutor antes da alta:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Foi dado aos pais todos os medicamentos necessários e/ou pomadas?• Incentive os pais continuar o tratamento de feridas adequado.• Instruir os pais a manter a alimentação da criança com alimentos moles/ líquido filtrado por aproximadamente 7 dias após a operação.• Informe aos pais que se a criança não tem pontos absorvíveis, eles terão de retornar ao cirurgião/hospital ou um médico local designado para removê-los aproximadamente 7 dias após a cirurgia.• Os pais foram alertados que deverão procurar atendimento médico em caso de infecção ou complicações (hemorragia, inchaço, pus, vermelhidão, sensibilidade, calor da ferida ou febre)?• Dar aos pais, números de telefone e instruções para chamar o cirurgião/hospital ou seu médico local em caso de dúvida ou emergência. Além disso, certifique-se de que o hospital tem detalhes de contato, incluindo número de telefone móvel, para a família. <p>Informe os pais que o futuro tratamento pode envolver cirurgias adicionais, terapia da fala e/ou Ortodontia. Discuta um calendário potencial para futura cirurgia de fissuras e necessidades de tratamento.</p>	<p><i>Revisão de enfermeira ou Assistente Social com os pais / tutor antes da alta</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Para reparação de lábio, instrua pais para lavagem de feridas cirúrgicas com sabão & água até que a ferida fecha e cura.• Informe os pais para aplicar um creme (ou emoliente) na pele ferida depois que a ferida cicatriza completamente (não mais tarde do que o pós-operatório de 4 semanas)• Demonstre aos pais como massagear o lábio (columela) com o creme com o polegar para baixo, uma vez que a ferida cicatriza, por 4-5 minutos duas vezes por dia por 3 meses.• Instruir os pais quando a criança pode começar a comer alimentos sólidos, com base na sua idade e tipo de operação.• Explicar para os pais a importância de voltarem para um acompanhamento em 3-6 meses (para um lábio leporino) ou 9-12 meses (para uma fissura palatina).• Tenha por escrito que os pais confirmam que compreendem todas as instruções que receberam, verbais e pro escrito para atendimento ao paciente após a cirurgia.• Agradeço o paciente por deixar você ter cuidado dele. Diga-lhes que caso eles conheçam alguém que poderia ser ajudado, por favor, informar o indivíduo sobre este tratamento que vocês oferecem.